

Servizio di Gastroenterologia

NORME DI PREPARAZIONE BREATH TEST UREA 13C ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAZIENTE:

La mattina del test dovrà osservare il digiuno completo, non dovrà lavarsi i denti e non potrà fumare.

Nelle tre settimane precedenti l'esame non dovrà assumere farmaci antibiotici e nelle due settimane precedenti non dovrà assumere farmaci gastroprotettori presenti in elenco:

ANTEPSIN (Sucralfato), PANTOPAN (Pantoprazolo), ANTRA (Omeprazolo), PANTORC (Pantoprazolo), AXAGON (Esomeprazolo), PARIET (Rabeprazolo), BIOMAG (Cimetidina), PEPTAZOL (Pantoprazolo), BRUMETIDINA (Cimetidina), PEPTIREX (Lansoprazolo), BUSCOPAN ANTIACIDO (Ranitidina), PERGASTRID (Lansoprazolo), CRAFTILM (Sucralfato), RANIBEN (Ranitidina), CRONIZAT (Nizatidina), RANIBLOC (Ranitidina), ERMES (Lansoprazolo), RANIDIL (Ranitidina), ESOPRAL (Esomeprazolo), ROXIT (Roxatidina), ETIDEME (Cimetidina), SENSIGARD (Ranitidina), EUGRASTRAN (Lansoprazolo), SUCRALFIN (Sucralfato), FAMODIL (Famotidina), SUCRAMAL (Sucralfato), FRILANS (Lansoprazolo), SUCRATE (Sucralfato), GASTRALGIN (Roxatidina), SUCRORIL (Sucralfato), GASTROGEL (Sucralfato), SURIL (Sucralfato), LANSOX (Lansoprazolo), TAGAMET (Cimetidina), LEVOGENIX (Lansoprazolo), TEMIC (Cimetidina), LIMPIDEX (Lansoprazolo), ULCEDIN (Cimetidina), LOMEVEL (Lansoprazolo), ULCEX (Ranitidina), LOSEC (Omeprazolo), ULCRAST (Sucralfato), LUCEN (Esomeprazolo), ULIS (Cimetidina), MEPRAL (Omeprazolo), ZANTAC (Ranitidina), MOTIAX (Famotidina), ZOTON (Lansoprazolo), NEOH 2 (Roxatidina), NEXIUM (Esomeprazolo), NIZAX (Nizatidina), OMEPRAZEN (Omeprazolo), PANTECTA (Pantoprazolo), PANTOLOC (Pantoprazolo) DURATA DEL TEST: 30minuti circa.

NORME DI COMPORTAMENTO: Una volta espirato nel primo campione (tempo zero), le verranno somministrate una soluzione con Urea da 37.5 mg. Successivamente dovrà restare in attesa, seduto, senza fumare, senza mangiare e bere per 30 minuti. Al termine del tempo stabilito le verrà chiesto di espirare nuovamente in una provetta